

Naam: M V
 Adres:
 Postcode: Woonplaats:
 Geboortedatum:
 Telefoonnummer:


Datum: Aantal dagen al klachten:
 Tijdstip opgevangen urine: Gewicht indien <12 jaar:
 Urine koel bewaard: Ja Nee

Graag aankruisen wat op u van toepassing is (meer dan 1 antwoord is ook mogelijk)

- Ik lever urine in voor controle na een antibioticakuur
- Ik lever urine in n.a.v. het spreekuur
- Ik ben zwanger. Hoeveel weken? weken
- Ik menstrueer op dit moment
- Ik heb een verblijfskatheter

Wat zijn uw klachten? (kruis aan wat van toepassing is, meer dan 1 klacht is ook mogelijk)

- Vaak kleine beetjes plassen of aandrang om te plassen, zonder dat er wat komt
- Pijn/branderig gevoel bij en/of na het plassen
- Incontinentie
- Pijn in de rug, zij of flanken (zie afbeelding)
- Bloed bij de urine
- Gevoel van ziek-zijn
- Koorts (temperatuur hoger dan 38,0 graden, rectaal gemeten) temperatuur:
- Veranderde vaginale afscheiding of irritatie
- Andere klacht of reden:



Kan er sprake zijn van een SOA? Ja Nee (Dit wordt niet standaard getest)

ONDERSTAANDE IN TE VULLEN DOOR DOKTERSASSISTENTE

Stick	Dipslide	Sediment
Nitriet: pos/neg	Dipslide: pos/neg	Bacteriën:
Leukocyten:	Cled:	Leukocyten:
Erytrocyten:	McConkey:	Erytrocyten:
Ketonen:		Amorf:
Glucose:		Epitheel:
Proteïne:		Overig:

Als bij verdenking op blaasontsteking (of urineweginfectie) onderzoek van urine nodig is, let dan op het volgende: **Urine is ‘midstroom’**.

Opvang midstroom urine

Geef het kind ruim te drinken. Kinderen jonger dan 2 jaar zullen binnen 20-30 minuten plassen.

Spreid de schaamlippen of trek de voorhuid terug en reinig de geslachtsdelen met een ruime hoeveelheid water (geen zeep). Laat het kind met bloot onderlijf op een aankleedkussen liggen of rondlopen. Vang de middelste urine op met een schoon potje.

Lukt dit niet, plak dan een plaszakje (verkrijgbaar bij de apotheek) en controleer elke 10 minuten of er urineproductie is. Laat het plaszakje maximaal 1 uur zitten.

Overige informatie

Sluit het potje goed af met het deksel. Vermeld naam en geboortedatum van uw kind op het potje.

Het beste is om de opgevangen urine direct naar de praktijk te brengen. Kan dit niet dan moet de urine in ieder geval **in de koelkast bewaard** worden.

De urine kunt u tussen naar de praktijk brengen.

Na uur kunt u de assistente bellen voor de uitslag.

Als bij verdenking op blaasontsteking (of urineweginfectie) onderzoek van urine nodig is, let dan op het volgende: **Urine is ‘midstroom’**.

Opvang midstroom urine

Plas het eerste deel van de urinestroom in het toilet, daarna vangt u de urine op in het potje en de rest plast u weer uit in het toilet.

Overige informatie

Sluit het potje goed af met het deksel. Vermeld naam en geboortedatum van uw kind op het potje.

Het beste is om de opgevangen urine direct naar de praktijk te brengen. Kan dit niet dan moet de urine in ieder geval **in de koelkast bewaard** worden.

De urine kunt u tussen naar de praktijk brengen.

Na uur kunt u de assistente bellen voor de uitslag.

Als bij verdenking op blaasontsteking (of urineweginfectie) onderzoek van urine nodig is, let dan op het volgende: **Urine is ‘midstroom’**.

Instructie plasopvang volwassenen en kinderen

Plas het eerste deel van de urinestroom in het toilet, daarna vangt u de urine op in het potje en de rest plast u weer uit in het toilet.

Opvang midstroom urine niet zindelijke kinderen

Geef het kind ruim te drinken, kinderen jonger dan 2 jaar zullen binnen 20-30 minuten plassen. Spreid de schaamlippen of trek de voorhuid terug en reinig de geslachtsdelen met een ruime hoeveelheid water (geen zeep). Laat het kind met bloot onderlijf op een aankleedkussen liggen of rondlopen; vang de middelste urine op met een schoon potje. Lukt dit niet, plak dan een plaszakje (verkrijgbaar bij de apotheek) en controleer elke 10 minuten of er urine productie is. Laat het plaszakje maximaal 1 uur zitten.

Overige informatie

Sluit het potje goed af met het deksel. Vermeld naam en geboortedatum van uw kind op het potje.

Het beste is om de opgevangen urine direct naar de praktijk te brengen. Kan dit niet dan moet de urine in ieder geval **in de koelkast bewaard** worden.

De urine kunt u tussen naar de praktijk brengen.

Na uur kunt u de assistente bellen voor de uitslag.